

黑龙江省种业技术服务中心文件

黑种技〔2025〕1号

关于印发《黑龙江省 2025 年农作物优质 高效品种种植区划布局》的通知

各市（地）、县（市、区）种业技术服务中心、农业综合服务（技术推广）中心（站），县（市、区）农业综合执法大队，北大荒农垦集团有限公司农业社会化服务办公室：

为加快农作物优质高效品种推广应用，提升农作物单产和品质，推进种业振兴，按照省农业农村厅的要求和部署，我中心组织科研院校、种子企业和推广单位专家，对玉米、水稻、大豆、小麦等农作物优质高效品种进行了评定，筛选出适合全省不同积温带种植的主导品种 298 个，其中玉米 39 个、水稻 32 个、大豆 42 个、小麦 10 个、马铃薯 18 个、高粱 19 个、谷子 11 个、杂豆 20 个、蔬菜 97 个、黑木耳 10 个，作为 2025 年黑龙江省农业主导品种，同时研究制定了《黑龙江省 2025 年农作物优质高效

品种种植区划布局》（以下简称《区划布局》）。现印发给你们，请结合本地农业生产实际，研究制定适合本地的《区划布局》，认真指导种植户科学选种用种，为促进粮食持续增产和农业高质量发展提供坚强保障。

附件：

- 1.黑龙江省 2025 年优质高效玉米品种种植区划布局
- 2.黑龙江省 2025 年优质高效水稻品种种植区划布局
- 3.黑龙江省 2025 年优质高效大豆品种种植区划布局
- 4.黑龙江省 2025 年优质高效小麦品种种植区划布局
- 5.黑龙江省 2025 年优质高效甜糯、青贮玉米品种种植区划布局
- 6.黑龙江省 2025 年优质高效马铃薯品种种植区划布局
- 7.黑龙江省 2025 年优质高效杂粮、杂豆品种种植区划布局
- 8.黑龙江省 2025 年主要露地蔬菜品种种植区划布局
- 9.黑龙江省 2025 年优质高效黑木耳品种区划布局

黑龙江省种业技术服务中心

2025 年 1 月 20 日

抄送：各市（地）、县（市、区）农业农村局

黑龙江省种业技术服务中心

2025 年 1 月 20 日印发

黑龙江省2025年优质高效玉米品种种植区划布局

积温带 作物	第一积温带上限	第一积温带	第二积温带	第三积温带	第四积温带	第五积温带
玉 米	东农256	丰禾16	东农264	东农281	益农玉14	益农玉18
	美亚81	天育108	鹏玉10	凯玉8	先玉1219	垦沃2
	龙单90（机收）	金博士825	龙单86	松玉438	东农257	东农270
	苏单128（机收）	敦玉213	丰禾13	德美亚3号	绥玉49	
		嫩单29	C2235	益农玉12	科沃9366	
			协玉306	克玉19	中垦玉22	
适宜区域	哈尔滨市双城区，绥化市肇东市，大庆市肇源南部。	哈尔滨市道里区，南岗区，道外区，平房区，松北区，香坊区，呼兰区，阿城区中部、西部，宾县中部、西部、北部，巴彦县南部，木兰县南部，五常市西北部，北大荒集团哈尔滨有限公司西部；齐齐哈尔市龙沙区，建华区，铁锋区，昂昂溪区，富拉尔基区，梅里斯达斡尔族区，甘南县南部，龙江县大部，泰来县，富裕县南部，北大荒集团齐齐哈尔分公司南部；牡丹江市东宁市东部；佳木斯市东风区，向阳区，前进区，桦川县南部，富锦市西南部，桦南县大八浪乡南部；大庆市萨尔图区，龙凤区，让胡路区，红岗区，大同区，肇州县，肇源县北部，林甸县，杜尔伯特蒙古族自治县；双鸭山市集贤县，友谊县，宝清县西北部，北大荒集团红兴隆分公司北部；七台河市新兴区西部，勃利县东部；绥化市北林区西部，望奎县西南部，兰西县，青冈县西部，安达市，明水县西部，北大荒集团绥化分公司南部。	哈尔滨市延寿县大部，巴彦县北部，阿城区东部高地，依兰县大部，方正县大部，宾县南部、东部，木兰县中部、西部，通河县南部，尚志市西部，五常市东南部，北大荒集团哈尔滨有限公司东部；齐齐哈尔市碾子山区，龙江县西部，甘南县北部、西部，依安县，富裕县东北部，克山县西南部，拜泉县西南部，讷河市西南部，北大荒集团齐齐哈尔分公司北部；牡丹江市东安区，西安区，阳明区北部、西部、西南部，爱民区南部，林口县北部，宁安市中部、北部，东宁市东南部，海林市东南部，北大荒集团牡丹江分公司大部；佳木斯市郊区，桦南县大部，桦川县北部，汤原县东南部，同江市，富锦市大部，抚远市，北大荒集团建三江分公司大部；鸡西市滴道区，鸡冠区，城子河区，恒山区，鸡东县中部，密山市大部，虎林市南部；双鸭山市岭东区，四方台区，宝山区，宝清县大部，饶河县西北部，北大荒集团红兴隆分公司大部；伊春市铁力市西部；七台河市茄子河区、新兴区东部，勃利县西部；鹤岗市兴安区，绥滨县，萝北县南部，北大荒集团宝泉岭分公司大部；绥化市北林区东部，望奎县东北部，青冈县东部，庆安县南部，明水县东部，绥棱县南部，海伦县南部。	哈尔滨市依兰县北部、南部，方正县东部，木兰县东北部，通河县北部，延寿县南部，尚志市东部；齐齐哈尔市克山县东北部，拜泉县东北部，讷河市东北部，克东县；牡丹江市爱民区北部，阳明区东南部，林口县南部，海林市东部，宁安市西部，穆棱市大部，东宁市中部；佳木斯市汤原县中部，同江市街津口乡，桦南县东部，抚远市浓江乡；鸡西市梨树区，麻山区，鸡东县南部、北部，密山市西部，虎林市北部；双鸭山市宝清县西部，饶河县东南部；伊春市铁力市中部；七台河市勃利县南部；鹤岗市东山区南部，萝北县中部，北大荒集团宝泉岭分公司西北部；黑河市北安市南部，五大连池市西南部，逊克县北部沿江地区，嫩江市西南部，北大荒集团北安分公司南部；绥化市庆安县中部，绥棱县中部，海伦县北部，北大荒集团绥化分公司中部。	哈尔滨市通河县中部、北部高地，尚志市东部高地；牡丹江市阳明区东部，林口县中部，绥芬河市南部，海林市中部，宁安市东部高地、南部高地，东宁市北部、南部、西部；佳木斯市汤原县西部；绥化市绥棱县北部，庆安县北部，北大荒集团绥化分公司北部；伊春市伊美区，乌翠区，金林区，南岔县，大箐山县，嘉荫县东部，铁力市东部；鹤岗市东山区中部，萝北县北部；黑河市爱辉区东部，逊克县北部，孙吴县东部，嫩江市南部，北安市北部，五大连池市中部，北大荒集团九三分公司大部，北大荒集团北安分公司大部。	牡丹江市绥芬河市北部，海林市西部；伊春市友好区，丰林县南部，嘉荫县西部，汤旺县北部；鹤岗市东山区北部；黑河市爱辉区中部，逊克县南部，孙吴县西部，嫩江市中部，五大连池市东北部；大兴安岭地区呼玛县东部。

黑龙江省2025年优质高效水稻品种种植区划布局

积温带 作物	第一积温带	第二积温带	第三积温带	第四积温带
水 稻	中科发5（上限）	绥粳18（香稻）	龙粳31	龙粳15
	龙稻203（香稻）	绥粳309	绥粳27（香稻）	龙粳47
	松粳28	齐粳10（香稻）	龙粳1624	龙粳1665
	五优稻4（上限）	绥粳106	龙粳57（糯稻）	龙庆稻22
	松粳212（上限）	绥粳135（香稻）	莲汇6612	绥粳131
	东富110	绥粳311（香稻）	绥粳103（香稻）	
	吉源香1（香稻）	龙粳1823（糯稻）	齐粳22	
	益农稻12（香稻）	绥粳136	龙粳3010	
	松粳83（上限）	龙庆稻32	龙粳1718	
适宜区域	哈尔滨市道里区，南岗区，道外区，平房区，松北区，香坊区，呼兰区，阿城区中部、西部，宾县中部、西部、北部，巴彦县南部，木兰县南部，五常市西北部，北大荒集团哈尔滨有限公司西部；齐齐哈尔市龙沙区，建华区，铁锋区，昂昂溪区，富拉尔基区，梅里斯达斡尔族区，甘南县南部，龙江县大部，泰来县，富裕县南部，北大荒集团齐齐哈尔分公司南部；牡丹江市东宁市东部；佳木斯市东风区，向阳区，前进区，桦川县南部，富锦市西南部，桦南县大八浪乡南部；大庆市萨尔图区，龙凤区，让胡路区，红岗区，大同区，肇州县，肇源县北部，林甸县，杜尔伯特蒙古族自治县；双鸭山市集贤县，友谊县，宝清县西北部，北大荒集团红兴隆分公司北部；七台河市新兴区西部，勃利县东部；绥化市北林区西部，望奎县西南部，兰西县，青冈县西部，安达市，明水县西部，北大荒集团绥化分公司南部。	哈尔滨市延寿县大部，巴彦县北部，阿城区东部高地，依兰县大部，方正县大部，宾县南部、东部，木兰县中部、西部，通河县南部，尚志市西部，五常市东南部，北大荒集团哈尔滨有限公司东部；齐齐哈尔市碾子山区，龙江县西部，甘南县北部、西部，依安县，富裕县东北部，克山县西南部，拜泉县西南部，讷河市西南部，北大荒集团齐齐哈尔分公司北部；牡丹江市东安区，西安区，阳明区北部、西部、西南部，爱民区南部，林口县北部，宁安市中部、北部，东宁市东南部，海林市东南部，北大荒集团牡丹江分公司大部；佳木斯市郊区，桦南县大部，桦川县北部，汤原县东南部，同江市，富锦市大部，抚远市，北大荒集团建三江分公司大部；鸡西市滴道区，鸡冠区，城子河区，恒山区，鸡东县中部，密山市大部，虎林市南部；双鸭山市岭东区，四方台区，宝山区，宝清县大部，饶河县西北部，北大荒集团红兴隆分公司大部；伊春市铁力市西部；七台河市茄子河区、新兴区东部，勃利县西部；鹤岗市兴安区，绥滨县，萝北县南部，北大荒集团宝泉岭分公司大部；绥化市北林区东部，望奎县东北部，青冈县东部，庆安县南部，明水县东部，绥化县南部，海伦县南部。	哈尔滨市依兰县北部、南部，方正县东部，木兰县东北部，通河县北部，延寿县南部，尚志市东部；齐齐哈尔市克山县东北部，拜泉县东北部，讷河市东北部，克东县；牡丹江市爱民区北部，阳明区东南部，林口县南部，海林市东部，宁安市西部，穆棱市大部，东宁市中部；佳木斯市汤原县中部，同江市街津口乡，桦南县东部，抚远市浓江乡；鸡西市梨树区，麻山区，鸡东县南部、北部，密山市西部，虎林市北部；双鸭山市宝清县西部，饶河县东南部；伊春市铁力市中部；七台河市勃利县南部；鹤岗市东山区南部，萝北县中部，北大荒集团宝泉岭分公司西北部；黑河市北安市南部，五大连池市西南部，逊克县北部沿江地区，嫩江市西南部，北大荒集团北安分公司南部；绥化市庆安县中部，绥棱县中部，海伦县北部，北大荒集团绥化分公司中部。	哈尔滨市通河县中部、北部高地，尚志市东部高地；牡丹江市阳明区东部，林口县中部，绥芬河市南部，海林市中部，宁安市东部高地、南部高地，东宁市北部、南部、西部；佳木斯市汤原县西部；绥化市绥棱县北部，庆安县北部，北大荒集团绥化分公司北部；伊春市伊美区，乌翠区，金林区，南岔县，大箐山县，嘉荫县东部，铁力市东部；鹤岗市东山区中部，萝北县北部；黑河市爱辉区东部，逊克县北部，孙吴县东部，嫩江市南部，北安市北部，五大连池市中部，北大荒集团九三分公司大部，北大荒集团北安分公司大部。

黑龙江省2025年优质高效大豆品种种植区划布局

积温带 作物	第一积温带	第二积温带	第三积温带	第四积温带	第五积温带	第六积温带
大豆	合农71	黑农531（高油）	垦农34	黑河43	龙垦306	龙达130
	农庆豆28	黑农84	东生22	龙垦3092	黑河45	黑科85
	黑农51	合农85（高油）	沃豆5	黑科60	佳豆30（高油）	金源602（高油）
	黑农82	黑农87（高油）	佳豆6（高油）	克豆44	黑科86	佳豆55（高油）
	黑农81（高油）	绥农52	绥农94	东生19	九研2（高油）	
	东农豆360（高蛋白）	绥农88（高蛋白）	绥农76（高蛋白）	黑科88		
	东农61（高油）	东农豆252	合农77（高油）	佳豆8（高油）		
		东生79（高油）	东农豆110（高油）	星农8号（高油）		
			牡豆69（高油）	峰豆3（高油）		
适宜区域	哈尔滨市道里区，南岗区，道外区，平房区，松北区，香坊区，呼兰区，阿城区中部、西部，宾县中部、西部、北部，巴彦县南部，木兰县南部，五常市西北部，北大荒集团哈尔滨有限公司西部；齐齐哈尔市龙沙区，建华区，铁锋区，昂昂溪区，富拉尔基区，梅里斯达斡尔族区，甘南县南部，龙江县大部，泰来县，富裕县南部，北大荒集团齐齐哈尔分公司南部；牡丹江市东宁市东部；佳木斯市东风区，向阳区，前进区，桦川县南部，富锦市西南部，桦南县大八浪乡南部；大庆市萨尔图区，龙凤区，让胡路区，红岗区，大同区，肇州县，肇源县北部，林甸县，杜尔伯特蒙古族自治县；双鸭山市集贤县，友谊县，宝清县西北部，北大荒集团红兴隆分公司北部；七台河市新兴区西部，勃利县东部；绥化市北林区西部，望奎县西南部，兰西县，青冈县西部，安达市，明水县西部，北大荒集团绥化分公司南部。	哈尔滨市延寿县大部，巴彦县北部，阿城区东部高地，依兰县大部，方正县大部，宾县南部、东部，木兰县中部、西部，通河县南部，尚志市西部，五常市东南部，北大荒集团哈尔滨有限公司东部；齐齐哈尔市碾子山区，龙江县西部，甘南县北部、西部，依安县，富裕县东北部，克山县西南部，拜泉县西南部，讷河市西南部，北大荒集团齐齐哈尔分公司北部；牡丹江市东安区，西安区，阳明区北部、西部、西南部，爱民区南部，林口县北部，宁安市中部、北部，东宁市东南部，海林市东南部，北大荒集团牡丹江分公司大部；佳木斯市郊区，桦南县大部，桦川县北部，汤原县东南部，同江市，富锦市大部，抚远市，北大荒集团建三江分公司大部；鸡西市滴道区，鸡冠区，城子河区，恒山区，鸡东县中部，密山市大部，虎林市南部；双鸭山市岭东区，四方台区，宝山区，宝清县大部，饶河县西北部，北大荒集团红兴隆分公司大部；伊春市铁力市西部；七台河市茄子河区、新兴区东部，勃利县西部；鹤岗市兴安区，绥滨县，萝北县南部，北大荒集团宝泉岭分公司大部；绥化市北林区东部，望奎县东北部，青冈县东部，庆安县南部，明水县东部，绥化县南部，海伦县南部。	哈尔滨市依兰县北部、南部，方正县东部，木兰县东北部，通河县北部，延寿县南部，尚志市东部；齐齐哈尔市克山县东北部，拜泉县东北部，讷河市东北部，克东县；牡丹江市爱民区北部，阳明区东南部，林口县南部，海林市东部，宁安市西部，穆棱市大部，东宁市中部；佳木斯市汤原县中部，同江市街津口乡，桦南县东部，抚远市浓江乡；鸡西市梨树区，麻山区，鸡东县南部、北部，密山市西部，虎林市北部；双鸭山市宝清县西部，饶河县东南部；伊春市铁力市中部；七台河市勃利县南部；鹤岗市东山区南部，萝北县中部，北大荒集团宝泉岭分公司西北部；黑河市北安市南部，五大连池市西南部，逊克县北部沿江地区，嫩江市西南部，北大荒集团北安分公司南部；绥化市庆安县中部，绥化县中部，海伦县北部，北大荒集团绥化分公司中部。	哈尔滨市通河县中部、北部高地，尚志市东部高地；牡丹江市阳明区东部，林口县中部，绥芬河市南部，海林市中部，宁安市东部高地、南部高地，东宁市北部、南部、西部；佳木斯市汤原县西部；绥化市绥化县北部，庆安县北部，北大荒集团绥化分公司北部；伊春市伊美区，乌翠区，金林区，南岔县，大箐山县，嘉荫县东部，铁力市东部；鹤岗市东山区中部，萝北县北部；黑河市爱辉区东部，逊克县北部，孙吴县东部，嫩江市南部，北安市北部，五大连池市中部，北大荒集团九三分公司大部，北大荒集团北安分公司大部。	牡丹江市绥芬河市北部，海林市西部；伊春市友好区，丰林县南部，嘉荫县西部，汤旺县北部；鹤岗市东山区北部；黑河市爱辉区中部，逊克县南部，孙吴县西部，嫩江市中部，五大连池市东北部；大兴安岭地区呼玛县东部。	伊春市汤旺县大部，丰林县北部；黑河市爱辉区西部，嫩江市北部，逊克东南部高地；大兴安岭地区加格达奇区，松岭区，新林区，呼中区，塔河县，漠河市，呼玛县西部。

黑龙江省2025年优质高效小麦品种种植区划布局

类型 作物	强筋品种	中强筋品种	中筋品种
小麦	龙麦35	龙麦77	红16-1142
	龙麦36	龙麦60	垦麦16
	克春140243	克春11	东农184826
		克春30	
适宜区域	黑龙江麦区		

黑龙江省2025年优质高效甜糯、青贮玉米品种种植区划布局

积温带 作物	第一、二、三积温带	第一、二积温带	第三、四积温带
	甜糯玉米	青贮玉米	
甜糯、青贮玉米	万糯2000	京科968	龙育15
	金糯262	江单18	阳光1号
	农科糯336		
	哈糯2022		
	哈粘5		

黑龙江省2025年优质高效马铃薯品种种植区划布局

类型 作物	鲜 食	食品加工	高淀粉
马铃薯	克新37（早熟）	龙薯14（炸条）	龙薯13（淀粉）
	龙薯12（早熟）	东农321（炸条）	克新41（淀粉）
	克新28号（早熟）	东农317（炸条）	东农310（淀粉）
	龙薯9号（中早熟）	龙薯8号（炸片）	垦薯1号（淀粉）
	东农312（中早熟）	克新30号(全粉)	
	克新35（中熟）		
	兴佳7号（中熟）		
	克新33（中晚熟）		
	龙薯4号（晚熟）		

黑龙江省2025年优质高效杂粮、杂豆品种种植区划布局

积温带 作物	第一积温带	第二积温带	第三积温带	第四积温带	第五积温带
高 粱	齐杂30	齐杂104号	龙杂21号	龙杂17号	齐杂107号
	糯粱4号		龙杂22号	龙杂19号	克杂21号
			龙杂25	龙杂20号	
			红糯15号	克杂16号	
			齐杂109号	克杂19号	
			绥杂10	齐杂722号	
			龙帚2号	齐杂5号	
谷 子	龙谷39	龙谷25	嫩选17号	龙谷44	龙谷26
	龙谷45	龙谷37			
	龙谷46	龙谷38			
	张杂谷13号	嫩选18			
杂 豆	嫩绿1号	龙芸豆21	龙芸豆5号	龙芸豆13	龙芸豆6号
	绿丰5号	龙红豆10号	龙芸豆27	龙芸豆32	龙芸豆14
	龙红豆17	龙红6号	龙芸豆35	龙芸豆33	
		嫩绿3号	绿丰2号	龙红豆11	
		嫩绿2号	齐红3号	龙红豆15	

黑龙江省2025年主要露地蔬菜种植区划布局

作物	积温带	品种名称	品种特性
大白菜	第一积温带	龙白10	杂交种。生育期75天～80天，株高43厘米，株幅70厘米，球高38厘米，球径24厘米，心叶白色，叶球为炮弹形，软叶较多，平均单株重3.5千克～4.0千克。高抗芜菁花叶病毒病，抗霜霉病。
	第一至五积温带	哈白6号	生育期80天～85天左右，株型半直立，生长旺势。株高49.8厘米，株幅69.5厘米，外叶绿色、倒卵形、无刺毛，叶面泡皱，中肋白色。叶球炮弹形，球高37厘米左右，球径22厘米左右，外叶数10片，球叶数42片，结球紧实整齐一致，单株重3.5千克左右。抗芜菁花叶病毒病，抗霜霉病，不耐抽薹。
		龙红1号	秋播，生长期75天左右。中桩平顶，小花心，外叶绿色，叶柄白绿色，心叶橙色，叶球为炮弹形，软叶较多，平均单株重3千克。抗芜菁花叶病毒病，抗霜霉病，中抗黑腐病。
		垦白1号	秋播，生育期72天左右。结球性较好，整齐度高。叶球合抱。外叶浅绿色，叶柄白色。外叶少，球叶45片以上，净菜率78%左右，单株重3.8千克左右。抗芜菁花叶病毒、霜霉病。
		东农907	秋播，生长期65天左右。外叶浅绿色，帮白色。合抱类型。单株重3.2千克左右，净菜率75%左右。风味品质优良，口感好、纤维少。适应性广。抗芜菁花叶病毒病，中抗霜霉病。
		秋地龙	生长期75天，平均开展度70厘米左右，株高45厘米左右，外叶9片～10片，叶片中等绿色、白帮、叶形椭圆形，叶面褶皱，球形合抱炮弹形，球形指数1.36，净菜率78.5%，结球紧实，整齐度高、叶质柔嫩、无筋、壮心快。平均单株重4千克左右。抗芜菁花叶病毒病，抗霜霉病，抗软腐病，耐抽薹。
		碧奥78	生长期78天左右。结球性较好，整齐好。外叶绿色，帮白绿色。株高42.5厘米左右，开展度66.5厘米左右。叶球合抱、圆筒形。叶面多皱，叶缘复齿。单株重3千克左右，净菜率75%左右。风味品质优良，口感好、纤维少。适应性广。喜肥水。中抗芜菁花叶病毒病，中抗霜霉病，中抗软腐病，不耐抽薹。
		阿尔新秀9号	生长期70～80天。株高40厘米，叶色深绿，叶柄白色，球叶数50片，球叶合抱呈炮弹形，球高36厘米，球径23厘米，球形指数1.56。平均单球质量4.03千克，芯叶微黄，结球紧实，净菜率75.%。抗芜菁花叶病毒病，抗霜霉病，高感根肿病，耐抽薹。
娃娃菜	第一至五积温带	金春娃	春、秋播均可，定植后45天左右收获。叶球合抱、筒形，内叶黄色，单球重0.6千克左右。抗芜菁花叶病毒病，感霜霉病。耐抽薹中等，耐热性中等。
		吉红娃娃	秋播，生长期60天左右。叶球合抱，直筒形，叶球顶部稍尖，叶内叶橘黄色，见光后呈橘红心。净球重0.8千克。高抗芜菁花叶病毒病和霜霉病，抗黑腐病。

黑龙江省2025年主要露地蔬菜种植区划布局

作物	积温带	品种名称	品种特性
结球甘蓝	第一至五积温带	绿兰	杂交种。春甘蓝，从定植到收获50天左右。外叶色绿，叶面蜡粉少，叶球紧实，圆球形，叶质脆嫩，品质优。单球重1～1.5千克。感黑腐病，感枯萎病，抗病毒病，耐裂球，耐抽薹。
		中甘301	杂交种。春甘蓝，早熟，生育期54天左右。单球重约1千克。感黑腐病，高抗枯萎病，抗病毒病，耐先期抽薹。
		中甘192	春播甘蓝杂交种。早熟，生育期60天左右。叶球圆形，绿色，叶球中等大小，单球重约1.3千克，感黑腐病，高抗枯萎病，抗病毒病。
		中甘1166	秋甘蓝。早熟。成熟期60天。杂交种。叶球圆球形、绿色，中心柱长占球高的比例0.50%。耐裂球，单球净重1.30千克。中抗黑腐病，
	第一、二、三积温带	春秋58	杂交种。春、秋播甘蓝，早熟，成熟期60天。单球净重1.1千克。抗黑腐病、枯萎病，耐裂球、耐抽薹性强。
		幕田喜悦	杂交种。秋甘蓝，熟期约60天。单球重约1.5千克。抗黑腐病，感枯萎病、根肿病，耐热性、耐寒性较强。
		中甘596	杂交种。秋甘蓝，中熟，生育期70天左右。单球重约1.5千克。抗黑腐病，高抗枯萎病，耐热。
麻椒	第一、二、三积温带 第四积温带上限	景麻辣2号	杂交种。鲜食型。早熟，从定植到始收40天左右。植株生长强，株型紧凑，连续坐果能力强，果实长灯笼形，皮薄有褶皱，纵径10厘米，横径8.5厘米，肉厚0.4厘米，青果绿色。中抗病毒病CMV，抗病毒病TMV，感疫病，抗炭疽病，耐低温弱光。
青/彩椒	第一、二积温带	红太极	杂交种。属鲜食无限生长方果型辣椒品种，植株生长势中等，节间短，大果，果实方形，果肉厚，长9～10厘米，直径9～10厘米，单果重200～260克。色泽鲜艳。以绿果采收为主，也可以红果采收，耐运输，货架寿命长，抗烟草花叶病毒病（Tm:0-3），番茄斑萎病毒病（Xcv:1-3），马铃薯Y病毒（PVY:0,1,1.2）。该品种有较好的耐寒性，适合早春日光温室和春夏大棚种植。
青椒	第一、二、三积温带	龙椒13	杂交种。鲜食。中早熟，熟期115天，直立生长，植株长势强，盛果期株高65厘米，株幅70厘米，叶片卵圆形中等绿色，首花节位10～12节，白色花冠，单株坐果能力强，果实方灯笼形，果面光滑、绿色，老熟后红色、味甜质脆，抗倒伏，平均单果重116克，肉厚0.6厘米。抗病毒病CMV，抗病毒病TMV，高抗疫病，抗炭疽病，耐低温弱光，抗逆行强。
		宇椒2号	鲜食型常规种。早熟，熟期110～115天。株高65～70厘米，株幅65～75厘米，方灯笼形，4心室，果面较光滑，平均单果重200～220克。鲜食，薄皮甜椒，商品性好，适合黑龙江省各地栽培，露棚两用，保护地栽培效果更好。中抗病毒病CMV，抗病毒病TMV，抗疫病，中抗炭疽病，耐低温弱光。

黑龙江省2025年主要露地蔬菜种植区划布局

作物	积温带	品种名称	品种特性
尖椒	第一、二、三积温带	龙椒9号	杂交种。鲜食、加工兼用。早熟品种，熟期103天。植株直立，长势强，株高50厘米，株幅60厘米，叶片卵圆形深绿色，首花节位8～9节，花冠白色，果实牛角形，，果面光滑，嫩果绿色，老熟果红色，微辣，果肉脆嫩，蜡质层薄，果实果肉厚0.3厘米，平均单果重90克。中抗病毒病CMV，抗病毒病TMV，抗疫病，抗炭疽病，耐低温弱光，耐热性强。
		龙椒10号	鲜食、加工兼用。中早熟，熟期103天，植株生长势强，株高50厘米，分枝性强，株幅60厘米，卵圆形叶片，深绿色，首花节位9～10节，花冠白色，嫩果绿色，老熟果红色，果实羊角形，果顶尖，果面光滑，果柄长向下弯，胎座小，平均单果重30克。味辣，果肉脆嫩，蜡质层薄，肉厚。中抗病毒病CMV，抗病毒病TMV，高抗疫病，抗炭疽病，耐低温、弱光。
		龙椒16	中早熟，熟期105天，植株直立，生长势强，株高70～90厘米，株幅50～70厘米，果实长牛角形，分杈早，幼椒果胎大，膨大快，连续座果强，横经6.0厘米，纵径26～32厘米左右，单果重120克，嫩果浅绿色，老熟果红色，辣味适中，光滑而富有光泽，果实商品性好，品质优良。植株上、下部果实大小较一致。抗病毒病CMV，抗病毒病TMV，中抗疫病，抗炭疽病，耐低温弱光，耐热性强。
		哈椒六号	开花节位9.5节，熟期早，播种到收获110天左右。半直立株型，生长势适中，整齐度高，分枝较强，结果集中，连续结果性能好。株高50厘米，株幅70厘米，叶片及果实呈绿色，果实短牛角形。果实纵径13厘米，横径3厘米，果肉厚0.25厘米，平均单果质量35克，单株结果50个～70个。微辣，食用口感好，质地脆嫩，老熟果红色。适应性广。维生素C含量86.86毫克/100克，辣椒素含量0.0032%。抗病毒病CMV，抗病毒病TMV，中抗疫病，抗炭疽病，耐低温寡照。
		景尖椒3号	鲜食、加工兼用杂交种。早熟，从定植到始收20天左右，株型紧凑，株高40厘米，株幅50厘米，叶片较小，叶色浓绿，6～7片真叶结果。果实短羊角形，果实纵径12～14厘米，横径2.5厘米，皮厚0.2厘米，单果重25克，青熟果深绿色，成熟果红色，辣味极强。高抗病毒病CMV，高抗病毒病TMV，抗疫病，抗炭疽病，耐低温，不耐弱光。
加工型红辣椒	第一、二积温带 第三积温带	龙椒15号	杂交种。加工型。中熟，熟期135天，直立生长，植株生长势强，盛果期株高60厘米，株幅65厘米，茎较粗，叶片卵圆形绿色，首花节位11～12节，花冠白色，花梗着生状态下弯，嫩果绿色，老熟果红色，辣味适中，果顶钝尖，果柄突出，干果果面平整，平均单果28.3克。抗病毒病CMV，抗病毒病TMV，高抗疫病，高抗炭疽病，耐低温弱光。
		景尖椒X01	杂交种。鲜食、加工兼用型。中熟品种，从定植到采收70天左右。株型紧凑，株高40厘米，株幅45厘米，叶片小，叶色深绿，坐果能力高，果实绿色，成熟鲜红色，果实纵径7～8厘米，横径1厘米，皮厚0.15厘米。高抗病毒病CMV，抗病毒病TMV，中抗疫病，抗炭疽病，耐低温弱光。
		景尖椒101	鲜食、加工兼用杂交种。早熟，从定植到始收20天左右，株型紧凑，株高40厘米，株幅45厘米，叶片较小，叶色深绿。果实细羊角形，果实纵径14～16厘米，横径1厘米，皮厚0.15厘米，青熟果绿色，成熟果红色，辣味强。高抗病毒病CMV，高抗病毒病TMV，抗疫病，抗炭疽病，耐低温，不耐弱光。

黑龙江省2025年主要露地蔬菜种植区划布局

作物	积温带	品种名称	品种特性
番茄	第一、二、三积温带	东农708	无限生长类型，生长势强，中熟，果实粉红色，颜色艳丽，大果型，平均单果重180～230克，最大可达800克，果实圆形，稍扁，整齐，果肉较厚，商品性好，酸甜可口，品质极佳。高抗烟草花叶病毒病，叶霉病，枯萎病，根结线虫病。适合于保护地栽培。
		东农722	无限生长类型，生长势较强，中晚熟。成熟果实粉红色，果实圆形，光滑，平均单果重200～220克。座果率高，每穗果4～6个果，果实整齐度好，果肉厚，硬度大，耐贮运。花萼大，美观，商品性状优良。感病CMV，感病叶霉病，抗病TMV，抗病枯萎病，感病TYLCV，感病根结线虫，耐低温。适合保护地栽培。
		东农725	有限生长类型，4花序～5花序封顶，生长势中等，中熟，成熟集中。成熟果实金黄色，颜色艳丽。果实长椭圆形，平均单果重90～120克，座果率高，每穗果达6～10个，果实整齐度极高，商品性好。果肉厚，硬度大，抗裂性强，耐贮藏运输。高抗烟草花叶病毒病、叶霉病、枯萎病和黄萎病。适合于保护地栽培。
		东农727	无限生长类型，生长势强，中熟，节间短，成熟集中。成熟果实粉红色，颜色鲜艳，平均单果重230～260克，果实圆形，光滑，整齐度好，商品性高。萼片美观，品质优良。硬度大，果肉厚，耐贮藏运输。高抗ToMV、叶霉病、枯萎病和黄萎病。适合于保护地栽培。
		东农728	无限生长类型，生长势强，中晚熟，花量大，座果率高，幼果有浅青肩，成熟果粉红色，颜色艳丽，平均单果重250克，果实整齐度高，硬度大，耐贮藏运输，产量高。高抗烟草花叶病毒、黄化曲叶病毒、枯萎病、黄萎病，适合保护地栽培。
		东农734	加工番茄杂交一代新品种，自封顶生长类型，2～3花序封顶，早熟，株高50厘米左右。植株生长势强，果实鲜红色，着色均匀，梗洼木质部延伸小，果实卵圆形，平均单果重70～80克。果柄无离层，成熟集中，适合机械采收。高抗烟草花叶病毒病，枯萎病、黄萎病。可溶性固形物6.1%，鲜果红色素含量8.5毫克/100克左右。果实硬度大，不裂果，耐贮藏，耐运输。适于加工番茄酱。
		SV0313TG	无限生长类型，中熟，植株长势中等，连续坐果能力强，果实均匀，商品果粉红色，扁圆形，无绿肩，平均单果重约240克，果实硬，耐裂，耐储运，口感酸甜。抗TMV、枯萎病和TYLCV，抗根结线虫，不耐高温。适合保护地栽培。
		宇番1号	无限生长型番茄，中熟品种，从播种到采收，110～115天左右。商品果黄色，圆形，颜色亮丽，果实肉厚、沙瓤，风味好。平均单果重250克，每株可结果7穗以上，每穗3～4个果，土壤肥沃可结4～6个果，过时整齐度高，抗病性好，适合于保护地栽培。
		宇番3号	杂交种，无限生长类型，生长势强，成熟期约115天。每穗果4～5个，平均单果重220克，成熟果实粉红色，青熟有绿肩，果实圆形，果蒂小，果面光滑，果肉厚，硬度大。抗叶霉病、TMV、枯萎病、TYLCV、根结线虫，耐低温弱光。适合保护地栽培。
		佐菲亚	杂交种。鲜食、加工兼用。大果番茄，红色。无限生长类型，植株长势强。早熟，商品果无绿果肩，果实扁圆形，果型指数0.76，硬度高，单果重200～230克，口感酸甜。可溶性固形物含量3.8%，番茄素含量0.039毫克/克，维生素C含量0.29毫克/克。高抗叶霉病、TMV和枯萎病，中感CMV、TYLCV和根结线虫。

黑龙江省2025年主要露地蔬菜种植区划布局

作物	积温带	品种名称	品种特性
茄子	第二、三、四积温带	哈茄亮剑2号	播种到始收大约108天，果色漆黑靓丽、果面顺直光滑、紫萼绿环、光泽度强，果型长条形，果长35厘米，果粗4.5厘米；平均单果重125克，果肉绿色细嫩，果实商品性好。
		哈茄V8	极早熟杂交种，从播种到收获95～100天，植株长势强，果皮黑亮，绿裤，尖头，果长25～30厘米，粗4～6厘米，平均单果重160～180克。高抗黄萎病，耐低温、高温，平均亩产6500～7000千克，适合在各紫长茄产区种植。
		哈农杂茄1号（哈茄2018）	极早熟杂交种，从播种到收获100天左右。植株长势强，果皮黑亮、绿裤，尖头，果长20～25厘米，粗4～6厘米，平均单果重120克。抗逆性强，抗病性好，尤其抗黄萎病，耐弱光，耐贮运。平均亩产在5000千克，适宜在紫长茄产区推广种植。
		龙园棚茄201	中早熟，株型半直立近直立，叶片深绿色，叶片小，茎杆黑紫色，茎上少生茸毛；果实长条形，纵径22～24厘米，横径4～5厘米，果条直有小钝尖，萼片下紫色，果皮黑紫色光亮；单果重150～180克；单性结实率高，连续座果性好，抗黄萎病、褐纹病和绵疫病。适宜黑龙江省早春及晚秋大棚栽培。
		黑美人	极早熟品种，熟期95天左右，生长势弱；果实细长条形，果长20～22厘米，果粗3.5厘米，单果重110克左右，果皮紫黑色，萼下绿色果环，亩产3000千克左右，适于春季露地栽培。
		黑美丽	中早熟品种，熟期105天左右，生长势中等；果实长条形，果长22～24厘米，果粗4.5厘米，单果重150克左右，果皮紫黑色，萼下绿色果环，果皮光亮，亩产4000千克左右，适于露地、覆膜抢早栽培。
		绿裤小黑龙	从播种到收获90天～100天，具有抗病、优质、高产、商品率高，商品性极佳等优点，植株长势强，抗倒伏，叶绿色，茎紫色。果实长棒型，果长28～30厘米，横径4.5～5.0厘米，果皮黑亮，绿果环，色泽好，果肉白色细嫩，单株结果10～12个，单果重150～180克，平均亩产6000～6500千克。高抗黄萎病。适合紫长茄产区种植。
		哈茄2号	早熟品种，熟期105天左右，植株直立，叶脉深绿，果实光滑黑亮有光泽，绿果环，果长22～25厘米，果粗4～5厘米，单果重160～180克左右，亩产3000千克左右，适于露地、覆膜抢早栽培。
		东茄6号	中早熟紫库茄子。茎秆直立，适于密植，叶片有刺。果实黑亮，果长25～30厘米，果粗5～6厘米，单果重180～200克，亩产可达4000千克，适合大棚和露地种植。
	第一、二、三积温带	龙杂茄18号	早熟品种，熟期100天左右，生长势较强；果实长条形小尖，果长22～24厘米，果粗4厘米，单果重150克左右，果皮紫黑色，萼下绿色果环，果皮光亮，果条顺直，商品性佳；亩产4000～54500千克，中抗黄萎病，抗褐纹病和绵疫病，适于露地、覆膜抢早栽培。
		哈茄V10	从播种到始收100天左右，植株长势强，绿果环茄子，果实长棒形，果顶部钝尖、果实黑亮，果长30～35厘米，果粗4～5厘米，平均单果重150～180克，平均亩产6000千克。抗黄萎病和褐纹病，耐低温弱光同时耐高温。适合露地和保护地栽培。
		哈农杂茄4号	极早熟杂交种，从播种到收获100天左右。植株长势强，果皮黑亮、绿裤，尖头，长形果，果长25～28厘米、粗4～5厘米，平均果单重160～180克。平均亩产在6000千克。抗逆性强，抗病性好，尤其抗黄萎病。耐弱光、耐贮运。适合在各紫长茄区种植。
		龙杂茄20号	中早熟品种，熟期103～105天，株型半直立，生长势；果实长条形，果长22～24厘米，果粗4.5厘米，单果重150克左右，果皮紫黑色，萼下绿色果环，果皮光亮，亩产4000千克左右，适于露地、覆膜抢早栽培。
		大龙茄子	中早熟杂交种，从播种到收获100～105天。植株长势强，紫环长茄，果皮黑亮，果长25～30厘米,果实长棒型，肉质软绵，烹饪容易褪色，亩产6000～6500千克。低抗黄萎病。适合紫长茄产区保护地、露地栽培。
		黑金刚	中晚熟品种，生育期115天左右，株型直立，生长势强；果实粗长大棒，果长28～30厘米，果粗6～8厘米，肉质软绵，果皮紫黑色，适宜紫长茄种植区露地栽培后用于干制或烧烤。
		迎春四号	植株直立，平均株高75厘米，株幅80厘米，果实长条形，果顶部钝尖，果实纵茎35厘米左右，横茎3.5～4厘米,单果重量150克左右，果萼紫色，果皮黑亮，果肉白绿色，极早熟，丰产性好，产量6000～7000千克。耐低温弱光能力强。
		紫龙九号	生长势强，植株半直立、开展度中等，商品茄长条形，果顶部钝尖，果长40厘米左右，果粗3.5～4厘米,单果重220～240克，果柄、萼片均为紫色，果皮黑紫色，果面光滑亮丽，高温不易褪色，连续做果能力强，亩产7000～7500千克。耐高温能力强。

黑龙江省2025年主要露地蔬菜种植区划布局

作物	积温带	品种名称	品种特性
油豆角	第一、二、三、四 积温带	哈优15号	蔓生绿荚油豆角品种。早熟，播种到采收56天左右，嫩荚长扁条形。平均荚长16.5厘米，荚横径2.2厘米。嫩荚绿色，强光照下有红色条纹。荚肉厚，外观商品性好，肉质甜面，荚壁无纤维，无缝线。抗逆性强，连续坐荚能力强。
		黑大绿冠	蔓生，早熟，荚扁条形，荚长15厘米，商品率高，荚纯绿色有光泽，肉质面，风味佳，无纤维，丰产，适应性广。
		哈优18号	蔓生油豆角品种。生长势强，早熟，播种到采收55天左右，植株连续结荚能力强。荚扁条形，嫩荚绿色带紫晕。平均荚长18厘米，荚横径2.8厘米。肉厚，肉质甜面，荚壁无纤维。
		黑大满堂彩	蔓生油豆角品种。生长势中等，分枝少。早熟，播种到采收55天左右，荚扁圆棍形，荚长15厘米，宽1.8厘米，厚1.0厘米，单荚重18克左右。荚黄色，有红色条纹。肉质面，纤维少，油豆角味浓。商品率高，丰产。
		金冠	超早熟黄荚矮生油豆角品种。播种到采收50天左右。生长势中等分枝多。花淡粉色，穗状花序，每花絮花4~6个。荚扁圆形，荚长16厘米，宽1.6厘米，荚厚1.0厘米，单荚重15克左右。荚黄色，老熟荚有红色条纹。肉质面，无纤维，油豆角风味浓，豆香味浓。商品率高，丰产，适合保护地及露地栽培，适宜条件下种植亩产可达1500千克。可与蔓生品种间作，可做秋白菜前茬。
		哈优5号	蔓生大马掌类型油豆角品种。生长势强，极早熟，播种到采收55天左右，嫩荚扁条形，荚深绿色带蓝纹，有光泽，平均荚长16厘米左右，宽3厘米左右，结荚多，商品率高，肉质面，无纤维，丰产性及抗病性好，亩产2500千克左右，适合保护地及露地栽培。
		哈优11号	蔓生绿荚油豆角品种。生长势强，早熟，播种到采收58天左右。嫩荚扁条形，绿色有光泽，着光有红尖。平均荚长18厘米，宽2.8厘米，坐荚能力强，无纤维。丰产，亩产2300千克。适合保护地及露地栽培。
		哈优12号	蔓生油豆角早熟品种。生长势强，早熟，播种到采收55天左右。嫩荚扁条形绿色，平均荚长20厘米，荚宽3厘米，连续坐荚能力强，荚外观商品性好，肉质面，荚壁无纤维。亩产2500千克。适合保护地及露地栽培。
		龙油豆8号	该品种生育期55~60天左右。蔓生，生长势较强，叶片绿色，花淡紫色，嫩荚绿色，着光部位荚的尖部有紫色条纹。豆荚扁条形，平均荚长20厘米，荚宽2.1厘米，单荚24克，外观商品性好，无纤维，肉质软面，抗逆性很强，耐低温弱光，适宜我省冬季保护地及露地栽培。
	第一、二、三积温 带	哈优7号	蔓生纯绿荚油豆角品种。生长势强，早熟，播种到采收60天，嫩荚扁条形，荚绿色，荚形整齐，平均荚长14.8厘米，宽2.1厘米，外观商品性好，肉质面，无纤维，油豆角类型，食用品质极佳。该品种抗病性强，抗逆性好，丰产，亩产2000千克左右。适于大棚及露地栽培。
		黄金钩	蔓生，晚熟，圆棍形，荚长12厘米左右，荚黄色，老熟荚带红色条纹，商品性好，无纤维，肉质面，荚豆兼食。
		黑大紫冠	蔓生，极早熟，前期基部分枝结荚，后期主蔓结荚，座荚能力强，荚扁条形，荚长18厘米荚绿色带紫色条纹，无纤维，肉质面，外观商品性好，品质优。
		西育22	早熟黄金钩，蔓生，早熟，圆棍形，荚长12厘米左右，荚黄色，老熟荚带红色条纹，商品性好，无纤维，肉质面，荚豆兼食。

黑龙江省2025年主要露地蔬菜种植区划布局

作物	积温带	品种名称	品种特性
西瓜	第一、二、三、四 积温带	百臣雷旺	鲜食型。全生育期95天左右，果实发育期28～30天左右。植株长势强健。第一雌花着生于主蔓5～8节。果实近圆形，红瓤，易做瓜，单瓜重8～13千克，果实表皮绿色，覆墨绿色锐齿形条纹。
		同创C3	早熟。果实发育期28天，全生育期99天。杂交种。中型，二倍体。植株生长势中，第一雌花位于第5节，雌花出现的间隔节位2。易坐果，果实近圆形。有果皮蜡粉。单果重6千克，瓜瓤红色。果皮厚度1厘米，果皮底色绿，果皮条纹条带显。
		景龙宝4号	鲜食型。生育期95天左右，开花至成熟35～38天。植株生长势强，第一雌花着生第8节，座果能力强，平均单瓜重12～15千克，果实长椭圆形，深绿花皮，果肉红色，纤维少，皮厚1厘米，耐运输。中心可溶性固形物含量11.5%，边可溶性固形物含量9.0%。抗枯萎病，不耐低温，较耐弱光。
		龙盛佳力	杂交种。鲜食型。生育期98天左右，果实发育期33天左右。植株生长势强，单果重7.8千克，花皮椭圆形具果霜，果肉红色。果皮硬韧，肉质紧实甜脆爽口。中心可溶性固形物含量12.1%，边可溶性固形物含量9.5%。高抗枯萎病，高抗炭疽病，耐低温弱光。
	第一、二、三、四 、五积温带	龙盛8号	生育期75天左右，植株生长势中等，果实发育期26天左右，果实花皮椭圆形，单果重3千克左右，果肉红色。耐运输、果实可食率高，肉质沙脆，口感甜，风味佳。中心可溶性固形物含量12.9%，边可溶性固形物含量10.9%，肉质口感沙脆。抗枯萎病，耐低温弱光。
		哈研蜜1号	播种至成熟生育日数88天左右。开花到采收30天～32天。植株生长势中等，果实正圆形，果实大小适合，单瓜重4.4千克左右，主蔓长222.6厘米，第一雌花开花节位一般在第5节～7节。成熟果实表皮无白霜，红瓤，纤维少，果肉汁多甘甜。
		龙盛佳美	鲜食型杂交种。生育期85天左右，植株生长势中等，果实发育期28天左右，果实圆形，单果重7千克左右，果肉红色。果皮硬韧，肉质酥脆，口感甜，风味佳。中心可溶性固形物含量13.5%，边可溶性固形物含量11.5%。抗枯萎病，较耐低温弱光。
		百臣雷首	鲜食。百臣雷首属于晚熟品种，出苗至成熟生育期90天左右，从开花至商品采收35天左右。植株形态属于长蔓，叶片二级裂刻程度表达状态为中，植株长势强健。第一雌花着生于主蔓6～8节。果实为近圆形，红瓤，果肉甜脆、果皮厚度0.8～1厘米左右。单瓜重8～15千克，果实表皮绿色，覆墨绿色锐齿形条纹。
		庆红2018	杂交种。鲜食型。晚熟品种，出苗至成熟生育期90天左右，开花到采收33天左右。果实高圆形，红瓤，果肉甜脆，果皮厚度1厘米左右，单瓜重8～12千克。果实表皮绿色，覆墨绿色锐齿形条纹。植株长势强。中心可溶性固形物12.1%，边可溶性固形物9.5%，果肉甜爽，中抗枯萎病，中抗炭疽病，耐低温弱光。

黑龙江省2025年主要露地蔬菜种植区划布局

作物	积温带	品种名称	品种特性
薄皮甜瓜	第一、二、三积温带	香瑞鸿喜	生育期62～65天，果实落花后25天成熟，果实短椭圆形，果皮底色为白色，果皮覆色为黄色，果皮斑点为浅绿色，瓜沟较明显，果实大小整齐，外形美观，浓郁清香，脆甜爽口，果实不易裂口，耐运性好，植株生长势强，子蔓、孙蔓均可结瓜，结瓜节位第一节，种子千粒重12克，单株结瓜3～6个，单瓜重0.45千克。
		景甜香玉3号	早熟，坐果后26天左右可采收，植株长势比较旺盛，叶片中等大，子蔓、孙蔓均可结瓜，坐果能力强，单果重0.45千克左右，果实短椭圆形，果皮黄白微绿，果面光滑有浅沟，果肉白色，肉厚2.5厘米，肉质脆。
	第一、二、三、四积温带	垦甜3号	全生育期77天，果实发育期29天。杂交种。植株生长势强，株形中等。雌花双性花，第一雌花位于第1节；雌花出现的间隔节位1节；子蔓坐果为主，坐果易，果实薄皮，椭圆形，果皮底色白。无果面裂纹。单果重量0.39千克；果肉白色，厚度1.70厘米；种腔中，果实香味浓，果实成熟后，果柄脱落易，商品果实率91.00%。
		香瑞靓甜	生育期65天～67天，果实椭圆形，果皮黄色，果实大小整齐，外形美观，品质优,肉质口感脆，香甜可口，果实不易裂口，耐运性好，植株生长势强，子蔓、孙蔓均可结瓜，单株结瓜4个～5个，单瓜重0.55千克。中心可溶性固形物含量13.8%,边部可溶性固形物含量10.5%。高抗白粉病,高抗霜霉病。
		龙庆8号	薄皮型品种。全生育期74天，果实发育期28天。杂交种。植株生长势强，株形中等。果实薄皮，卵圆形，果皮底色白。无果面裂纹。单果重量0.38千克；果肉白色，甜脆清香。中心可溶性固形物含量13.10%，边部可溶性固形物含量9.50%。抗白粉病，抗霜霉病，高抗枯萎病。
		龙甜8号	薄皮杂交种。全生育期65天左右，果实发育期25天。果实短椭圆形，乳黄皮，尾有绿晕，转色速度快，白肉，黄白瓤，果肉甜脆，平均单瓜质量0.48千克，植株长势强，叶片肥大，生长速度快，单株结瓜5～7个。果实整齐一致，商品性突出，采收期集中，耐贮运。中心可溶性固形物含量13.2%，边部11.7%。抗白粉病，抗霜霉病，抗枯萎病。
	第一、二、三、四、五积温带	泽甜金誉	全生育期84天，果实发育期31天。杂交种。植株生长势强，株形中等。雌花双性花，第一雌花位于第3节；雌花出现的间隔节位2；子蔓孙蔓均可坐果，坐果易，果实薄皮，卵圆形，果皮底色白。无果面裂纹。单果重量0.35千克；果肉白色，厚度1.80厘米；种腔中，果实香味浓，果实成熟后，果柄脱落难易中等，商品果实率99.00%。
		鹤丰春早	全生育期70天，果实发育期27天。杂交种。植株生长势中，株形中等。雌花双性花，第一雌花位于第1.0节；雌花出现的间隔节位2.0节；子蔓孙蔓均可坐果，坐果易，果实薄皮，梨形，果皮底色白。无果面裂纹。单果重量0.3千克；果肉白色，厚度1.53厘米；种腔大，果实香味浓，果实成熟后，果柄脱落难，商品果实率97.90%。

黑龙江省2025年主要露地蔬菜种植区划布局

作物	积温带	品种名称	品种特性
华南型 黄瓜	第一、二、三积温带	盛秋2号	植株长势较强，雌花节率高，主蔓结瓜为主，分枝性较弱，节间较短，叶片中等大小，第一雌花在3～5节，瓜条膨大速度快，瓜条顺直，瓜长20厘米左右，皮色浅绿，白刺稀少，种子腔小，清香味浓。具有单性结实能力。中抗白粉病，抗霜霉病，高抗枯萎病，耐低温弱光。
		绿春2号	植株长势中等，早熟性好，强雌型，主蔓结瓜为主，叶片中等大小，第一雌花节位2节左右，瓜条顺直，短圆筒型，瓜长20厘米左右，皮色浅绿、刺瘤白色、稀少，种子腔小，清香味浓。中抗白粉病，抗霜霉病，抗枯萎病，抗角斑病，耐低温弱光。
		龙园翼剑	植株长势强，早熟，全雌性，分枝力强，第一雌花节位在1～2节，结瓜能力强。果实棒状，瓜长18～20厘米，果实重量140克，刺瘤白色、小、疏，瓜条顺直，果肉浅绿色，具有单性结实能力。抗白粉病，高抗霜霉病，抗枯萎病，耐低温弱光。
		四季丰	强雌性小刺溜品种，长势较强，分枝弱，节间短，心形五角形叶片，叶色浓绿，叶片大小中等，果实圆筒形，纵茎16～18厘米，横茎3.5～4.3厘米，顺直，浅绿色，瘤较小、稀疏，刺白色。连续坐果性好，较抗霜霉病与枯萎病，较耐热。
		东农815	生长势强，强雌型，雌花节率高，熟性中。果实棒状，横径3.60厘米，瓜把长3.80厘米，瓜长28.90厘米。皮色中绿，光泽度强，棱中，刺密，刺白色，瘤密，瘤极小，单瓜重210.00克。
	第二、三、四积温带	田骄七号	强雌性大刺溜品种，长势较强，分枝弱，节间长度中等，心形五角形叶片，叶色浓绿，叶片大小中等，果实圆筒形，纵茎16～18厘米，横茎3.5～4.3厘米，顺直，浅绿色，瘤较大、稀疏，刺白色。连续坐果性好，中前期坐果集中，较抗霜霉病与枯萎病。
		哈研1号	生长势强，叶型中等大小，叶片上倾，叶色浓绿，连续可座瓜5～8个，平均单瓜重94克，商品瓜长15厘米，直径2.5厘米，果形端直，无瓜把，果皮深绿色有光泽，表面无刺瘤，果肉绿色、皮薄、肉厚、心腔小，清香味浓，略带甜味。
		龙园黄冠	植株长势中等，主蔓结瓜为主，叶片中等大小，第一雌花节位4节左右，早熟性好，瓜码较密，瓜条顺直，果实纺锤形，瓜长20厘米左右，皮色浅绿、油亮，刺瘤白色、稀少，种子腔小，清香味浓。中抗白粉病，抗霜霉病，抗枯萎病，抗角斑病，耐低温弱光。
华北型 黄瓜	第一、二、三积温带	津优35号	植株生长势强，叶片中等大小，以主蔓结瓜为主，瓜码密，单性结实能力强，回头瓜多。瓜条生长速度快，早熟性好，耐低温、弱光能力强。瓜条棒状，皮色深绿均匀、光泽度好，瓜把小于瓜长1/7，心腔小于瓜横径1/2，刺密、无棱、瘤中等，腰瓜长32～34厘米，单瓜重200克左右，品质好，商品性佳。适应性强，不早衰
		龙绿2号	植株长势中等，早熟，主蔓结瓜为主，叶片绿色，中等大小，第一雌花节位5节左右，雌花节率53%，瓜码较密，商品性好，果实棒状，瓜长30厘米左右，皮色深绿、刺瘤白色较密，种子腔小，口感好，抗霜霉病、白粉病，耐较耐低温弱光。
欧洲型 黄瓜	第一、二、三积温带	亮靓	植株长势中等，强雌型，主蔓结瓜为主，叶片中等大小，第一雌花节位2节左右，瓜条顺直，短圆筒型，瓜长18厘米左右，皮色深绿、无刺无瘤，种子腔小，清香味浓。耐低温弱光。

黑龙江省2025年优质高效黑木耳品种区划布局

作物	品种名称	特征特性	适宜区域
黑木耳	黑威S1908	单片无根、鲜耳碗状、圆边、筋脉少（半筋），干耳形好，易卷边，黑灰色，商品性好，售价高；中熟品种，出芽快、整齐；耐水、抗杂，适合大棚挂袋和地摆。	各地均可栽培
	黑威15	出耳早，子实体单片，耳片碗状，圆边，背面有筋脉，耳片背面为黑褐至黑灰色，腹面黑色，有光泽。产量高。耳片韧性好，抗杂菌感染能力比较强，不易烂耳。	
	黑威单片	单片、无筋型新品种。特点：单片、无根、耳片平滑、无筋或少筋、肉厚、边缘圆整；干耳腹面黑色、背面灰色，易形成茶叶菜，商品性极佳；中晚熟、耐高温、耐大水，抗杂性强，适合小口和大棚出耳。	
	牡耳1号	子实体单片、无根、元宝状、色黑，耳片边缘整齐，干耳背、腹面明显，腹面呈黑色，光滑，发亮，背部青褐色，外被有短绒毛，多脉状褶皱（多筋），口感软糯，弹性好，胶质成分丰富。抗杂能力强，尤其是抗“流耳”能力强。属于中早熟品种。	
	牡耳2号	子实体单片、根小、色黑、碗状、圆边、耳厚，干耳背、腹面明显，腹面呈黑色，光滑，发亮，背部青褐色，外被有短绒毛，少脉状褶皱（少筋），弹性好，胶质成分丰富。	
	牡耳多筋	子实体耳黑，肉厚，圆边，腹面为灰色，筋脉多，抗杂，耐水性较好，形成耳芽快，出耳时间集中，从形成原基至采摘结束（20℃～25℃）约为40天。	
	牡耳半筋	子实体单片，无根，出芽早，展耳快。阴阳面清楚，背面瓦灰色，边缘整齐，圆形小耳，筋脉少（半筋），性状稳定。耐高温，耐大水，连雨天不烂耳，抗杂菌能力强。产量高并且稳定。	
	黑尊4号	中早熟品种，适宜12～24℃生长，耳片碗状、色黑。低温下出芽快、齐、开片快。微筋，正反面明显。菌丝生长速度快，呼吸量大注意通风。菌丝满袋后给予20天左右的菌丝后熟时间，温度18～20℃，有利于产量提升。	
	东林黑厚圆	子实体单片，根小，耳片边缘圆润，筋脉少（半筋），色质黑厚，晾晒后正反面明显。干湿比大、泡发率高、胶质成分丰富，售价高。耳芽形成快，耳片生长速度快，抗逆性极强，属于中熟品种。	
	东林黑元帅	耳芽形成极快且特别整齐，耳片生长速度较快，色泽乌黑、耳形好、呈碗状，肉厚无根、口感脆嫩，基本无筋脉，晾晒后正反面明显。泡发率高，商品价值高。抗逆性强，耐大水。属于中早熟品种。	